

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986
תרופה זו חייבת מרשם רופא.
 קראו/י בעיון את סופו עד סופו ברשת השתמשו/י בתרופה
 פורמט עלון זה קיבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי מ/2010/11.

נורטילין 25 מ"ג טבליות

הרכב: Nortriptyline hydrochloride 25 mg
חומרים בלתי פעילים:

Lactose, Starch ,Sodium starch glycolate, PVP K 30, Magnesium stearate, Acacia, Acetone, Alcohol, Carnauba wax, Cellulose acetate phthalate, Colloidal silicone dioxide, Color D&C yellow no. 10 lake 18-24%, Diethyl phthalate, Color FD&C yellow no. 6 aluminium lake 15-18% , Gelatin, Industrial methylated spirits, Isopropyl alcohol, Liquid glucose, Methylparaben, Monobasic Potassium phosphate, Povidone, Precipitated calcium carbonate, Polyethylene glycol, Propylparaben, Purified water, Sodium benzoate, Sucrose, Talc, Titanium dioxide.

קבוצה תרופתית: תכשיר נוגד דיכאון מקבוצת הטרזיקליים.

פעילות רפואית: לטיפול במצב דיכאון.

מתי אין להשתמש בתכשיר:

אל תשתמשו בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.
 אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד התרופה או לתרופה אחרת נגד דיכאון מקבוצת הטרזיקליים.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מלקיח בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הלב ו/ או כלי דם (לחץ דם גבוה), עיניים (כגון גלאוקומה), הכבד, הכליה, מערכת השתן (עצירת שתן), מערכת העיכול הפרעות קיבה, מעיים), בלוטת הערמונית, בלוטת התריס, אפילפסיה, מערכת העצבים-מחלות פסיכיות כגון: סכיזופרניה או מאניה, אלקוהולים.

אין תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה זו עלול לפגוע בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או משחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אין לשתות יינות או משקאות רחיים בתקופת הטיפול עם התרופה.

תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש: על-כן המנעו/י מחשיפה לשמש דאגו/י להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

אזהרות: אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

חולים קשישים על יתר רגישים להשפעות התרופה.

יש להודיע לרופא על נטילת תרופה זו לפני שימוש בכל תרופה אחרת.

יש להיזהר בזמן מעבר ממצב שכביה/ישיבה למצב עמידה מתוך חשש לסחרחורת.

יש להודיע לרופא על נטילת תרופה זו לפני ביצוע כל סטס רפואי או ניתוח (כולל ניתוח שיניים).

תרופה זו אינה מועדפת לטיפול בילדים מתחת לגיל 12.

מומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יקעבו אחר שינויים כגון: הגברת הדיכאון, מחשבות אבדניות, תוקפנות וכו'. במידה וחלו שינויים אלה יש לפנות מיידי לרופא. יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגילאי 18-24.

בילדים ובמתבגרים ובמקרים צעירים עד גיל 24 אשר לקחו תרופות נוגדות דיכאון-נצפתה עליה בתופעות לואו כגון: ניסיון התאבדות, מחשבות אבדניות ועינות.

למרות זאת הרופא שלך יכול לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב שהה לטובתך. אם הרופא רשם לך את התרופה הזאת ואתה מעונין/ת לשוחח איתו / פנה/י חזרה לרופא. עליך לדון לרופא שלך

אם הופיעו חלק מתופעות הלואי שפורטו או שכן החומר.

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות תקופתיות ללב, כליה, כבד, לחץ דם, א.ק.ג., גלאוקומה, בדיקות שיניים.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדון לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצה הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, פרקיסון, אפילפסיה) תרופות נגד דיכאון, תרופות להורדת לחץ דם, לטיפול ביתר פעילות של בלוטת התריס, סימיטידין, תרופות נגד שיעול והצטננות, תרופות עם פעילות סימפוטומיטית, תרופות בולמי M.A.O., ברביטורטים, פנוטיאזינים, קלונדין, גואנאדרל, גואנאדין, תרופות היוצרות תגובות אקסטרופרמידיאליות. יש להפסיק השימוש בתרופות אלה שבעתים לפני נטילת תרופה זו.

תופעות לואוי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לואוי כגון: יובש בפה, פריחה, בחילה, נמנום, סחרחורת, כאב ראש, עייפות או חולשה קלה, תאבון מוגבר ועקב כך עליה במשקל. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: שיבוש הראיה, בלבול, הזיות, עלפון, עצירות, דופק מהיר, קושי במתן שתן, רעד שרירים (נדיר) הפסק הטיפול ופנה לרופא.

ירידה בתפקוד המיני (נדיר): המשיך בטיפול ופנה לרופא מיד!

כאבים בעיניים, חוסר שקט, בעיות בדיבור או בבלעיה, חוסר שיווי משקל, נוקשות של הזרועות והרגליים פנה לרופא מיד.

בכל מקרה שבו הינך מרגישה תופעות לואוי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון: מינון לפי הוראת רופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת או התקופה המומלצת.

אם שכחת לטול תרופה זו בזמן קצוב יש לטול מנה מיד כשזכרת: אך בשום אופן אין לטול שתי מנות ביחד.

אופן השימוש: אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים.

יש לטול התרופה עם או אחרי הארוחה.

לא ניתן לחצות/לכונש את הטבליה.

כיצד להצטעף לטול/י לטול/י להחלפת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור ממצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

הפסקת הטיפול צריכה להיות הדרגתית. דרוש זמן עד שמושתת הפעילות האנטי דיכאנית של התרופה (בין 1-6 שבועות).

מנעו/י הרעלה תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעו/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבאו/י אריזת התרופה איתך.

אל תגרבו/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא/ תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחרת היא עלולה להזיק. אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. **אין לטול תרופות בחשבו**

בדוק/י תהוות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: יש לאחסן במקום יבש ובמטפריטורה מתחת ל-25°C.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב אחרת היא התפוסה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה.

אין לטול תרופות שונות באותה אריזה.

מס' ירושם התרופה: 00-20692-15-030

יצור: רקח תעשיית התרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון.

מק"ט: SNO1002A 12/10

נشرة طبية للمستعمل بموجب أنظمة الصبيلة (مسحورات) 1986
 هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب.

اقرأ/ي النشرة يامعان حتى نهايتها حتى نأخذها قبل استعمالك للدواء
 صادقت هذه النشرة وفحص محتواها من قبل وزارة الصحة في 11/2010.

نورتيلين ٢٥ ملغ اقراص

التتركيب: Nortriptyline hydrochloride 25 mg
المواد غير الفعالة:

Lactose, Starch ,Sodium starch glycolate, PVP K 30, Magnesium stearate, Acacia, Acetone, Alcohol, Carnauba wax, Cellulose acetate phthalate, Colloidal silicone dioxide, Color D&C yellow no. 10 lake 18-24%, Diethyl phthalate, Color FD&C yellow no. 6 aluminium lake 15-18% , Gelatin, Industrial methylated spirits, Isopropyl alcohol, Liquid glucose, Methylparaben, Monobasic Potassium phosphate, Povidone, Precipitated calcium carbonate, Polyethylene glycol, Propylparaben, Purified water, Sodium benzoate, Sucrose, Talc, Titanium dioxide.

المجموعة العلاجية: مستحضر مضاد للاكتئاب من مجموعة التريبتيسيكليات.

تأثيرات الدواء الطيبة: هذا الدواء مخصص لعلاج حالات الاكتئاب.

مתי لا يجوز لك استعمال المستحضر ؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا كنت حاملاً او مرضعة.

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته او لدواء آخر مضاد للاكتئاب من مجموعة التريبتيسيكليات.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

اذا كنت تعاني/ن أو اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي (كأربو). القلب و/ او الاوعية الدموية (ضغط دم عالي), العينين (مثل الجلاوكوما), الكبد, الكلى/ المسالك البولية (انحساب البول), الجهاز الهضمي (مشاكل المعدة, الامعاء), الغدة الدرقية, غدة البروستاتا, المرع, الجهاز العصبي - امراض نفسية مثل: سكينوزفروبيا (القصام) او مانيا (هوس), ادمان الكحول.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية ؟

قد يصف لك هذا الدواء من يظنك, لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات, تشغيل ماكاتنا خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة. يجب تحذير الطفل/ة من ركوب الدراجات, اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

يمنع تناول الكحول او مشروبات روحية في فترة العلاج بهذا الدواء.

قد يؤدي هذا الدواء الي حساسية خاصة اثناء التعرض للشمس: لذا ابتعد/ي عن التعرض للشمس واحرص/ي لوقاية مناسبة (ملايس طويلة, قبعة, مرآه واقية وما شابه).

تحذيرات:

اذا كانت لديك حساسية لنوع من الطعام او الدواء, فليكن اعلام الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.

المرضى كبار السن هي اكثر حساسية لتأثيرات الدواء.

يجب اعلام الطبيب عن تناول هذا الدواء قبل استعمال دواء آخر.

يجب الحذر عند الانتقال من وضعية استلقاء/ جلوس لوضعية الوقوف خوفاً من الدوخة.

يجب اعلام الطبيب عن تناول هذا الدواء قبل القيام بأي فحص طبي او عملية جراحية (يشمل جراحة الاسنان).

يوصى للدواء عند علاج الاولاد دون سن ١٢ سنة.

بيد للمعالجين وابناء عائلاتهم تعقب تغيرات مثل: زيادة الاكتئاب, التفكير في الانتحار, عودانية وما شابه. في حالة حدوث مثل هذه الامور يجب التوجه للطبيب فوراً. يجب الانتباه جيداً بالنسبة لهذه التوصية بالمعالجين الشباب بين ١٨-٢٤ سنة.

للادولاد والبالغين والشباب حتى سن ٢٤ الذين تناولوا ادوية ضد الاكتئاب - لوحظ ارتفاع في الاعراض الجانبية مثل:



PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986

The dispersing of this medicine requires a doctor's prescription.
Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine
This leaflet has been imprinted and checked by health ministry of Israel. –11/ 2010

NORTYLIN 25mg

Tablets

Composition: Each tablet contains: Nortriptyline hydrochloride 25 mg

Inactive ingredients: Lactose, Starch ,Sodium starch glycolate, PVP K 30, Magnesium stearate, Acacia, Acetone , Alcohol, Carnauba wax, Cellulose acetate phthalate, Colloidal silicone dioxide, Color D&C yellow no. 10 lake 18-24%, Diethyl phthalate, Color FD&C yellow no. 6 aluminium lake 15-18%, Gelatin, Industrial methylated spirits, Isopropyl alcohol, Liquid glucose, Methylparaben, Monobasic Potassium phosphate, Povidone, Precipitated calcium carbonate, Polyethylene glycol, Propylparaben, Purified water, Sodium benzoate, Sucrose, Talc, Titanium dioxide.

Therapeutic group: Tricyclic antidepressant.

Therapeutic activity: For the treatment of depressive states.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to another Tricyclic antidepressant.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of: the respiratory system (e.g. asthma), the heart and/or vascular system (hypertension), the eyes (e.g. glaucoma), the liver, the kidney/urinary tract (urinary retention), the digestive system (gastrointestinal and bowel disturbances), the prostate gland, the thyroid gland, epilepsy, the nervous system- psychiatric diseases such as schizophrenia or mania , Alcoholism.

How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine may impair alertness and therefore caution should be exercised when engaging in activities such as driving a car, operating dangerous machinery and in any other activity which requires alertness. Children should be cautioned against engaging in activities such as bicycle riding, playing near roads and the like.

Do not drink wine or alcoholic beverages while under treatment with this medicine.

This medicine may cause a special sensitivity when the patient is exposed to the sun, therefore, avoid exposure to the sun and take appropriate precautions (long clothes, a hat, protective creams, etc.).
Warnings: If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine.

Elderly patients are more sensitive to the effects of this medicine.

Inform your doctor that you are taking this medicine before using any other medication.

Caution should be exercised when getting up from sitting/lying position to a standing position because of possible dizziness.

The doctor should be informed that you are taking this medicine if you are about to undergo medical tests or surgery (including dental surgery).

This medicine is not intended for administration to children under 12 years.

Patients and their family members are advised to observe changes, such as: worsening of depression, suicidal thoughts, aggressiveness, etc. If such changes occur - refer to the doctor immediately. Extreme caution should be exercised in following this recommendation in young patients 18-24 years of age. In children, adolescents and young adults below 24 years of age who took antidepressants, an increase was observed in side effects such as suicide attempts, suicidal thoughts and hostility. Nevertheless, your doctor can prescribe this medicine, if he thinks it will benefit you.

If your doctor prescribed this medicine to you and you are interested in discussing it with him, consult the doctor again. You must report to the doctor if some of the above side effects appear or get worse.

During treatment with this medicine, the following tests should be performed: periodical cardiac tests, kidney, liver, blood pressure, ECG and dental exams.

Drug interactions: If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: drugs affecting the central nervous system (e.g. sedatives, hypnotics, drugs for parkinsonism, epilepsy), antidepressants, antihypertensives, drugs for the treatment of hyperthyroidism, cimetidine, cough and cold preparations, sympathomimetic drugs, MAO inhibitors, barbiturates, phenothiazines, clonidine, guanadrel, guanethidine, medicines causing extrapyramidal reactions. Use of these medicines should be discontinued 2 weeks before taking this medicine.

Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: dryness of the mouth, rash, nausea, drowsiness, dizziness, headache, mild tiredness or weakness, increased appetite followed by weight gain. These side effects usually disappear within a short time following the period of adaptation to the medicine.

Effects that require special attention: Blurred vision, confusion, hallucinations, fainting, fast heartbeat, difficult urination, muscle tremors (rare): stop treatment and refer to the doctor. Impairment of sexual function (rare): continue treatment and refer to the doctor immediately.

Pain in the eyes, Restlessness, difficulties speaking or swallowing, unbalance, stiffness of arms and legs- refer to the doctor immediately.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

Dosage: Dosage is according to doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dosage or recommended period. If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember, but never take a double dose to compensate for a missed one!

Directions for use: Do not chew! Swallow the medicine with water. You may take this medicine with or after a meal.

Do not halve or crush the tablet.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the doctor.

Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine without consulting your doctor.

Dosage should be reduced gradually. It takes time until the antidepressant effect is obtained (between 1 to 6 weeks).

Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning.

If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you. **Do not induce vomiting** unless explicitly instructed to do so by a doctor! This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm. Do not give this medicine to your relatives, neighbours or acquaintances. **Do not take medicines in the dark!** Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a dry place and at a temperature below 25°C. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License number: 030-15-20692-00

Manufacturer: Rekah Pharm. Prod. Ltd. . 30 Hamelacha St., Holon.

محاولة الانتحار، التفكير في الانتحار والعداء.

رغم ذلك بإمكان طبيبك أن يسجل لك هذا الدواء إذا ظن أن هذا لمصلحتك. إذا قام طبيبك بتسجيل هذا الدواء من أجلك وترغب في الحديث معه بالنسبة لذلك – توجه مجدداً إلى الطبيب. عليك إبلاغ الطبيب إذا ظهرت لديك بعض الأعراض الجانبية التي ذكرت أو إذا زادت.

في فترة العلاج بهذا الدواء يجب القيام بفحوص دورية للقلب، الكلى، الكبد، ضغط الدم، أي كي جي، جلوكوما (زرق)، فحص أسنان.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى / إن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (كالأدوية المهدئة، المنومة، باركينسون، الصرع)، أدوية ضد الاكتئاب، أدوية مخفضة لضغط الدم، العلاج بآبى عمليات الغدة الدرقية، سيميتيدين، أدوية لعلاج السعال والرشح، أدوية مع فعالية ودية، مثبطات موناامينو وكسيدان، فانيوتازينات، كلوندين، جوانادريل، جوانتيدين، أدوية تنتج تفاعلات خارج هرمية. يجب التوقف عن استعمال هذه الأدوية أسبوعين قبل تناول هذا الدواء.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، طفح، غثيان، نومة، دوخة، ألم رأس، تعب أو ضعف خفيف، شهية زائدة وبهذا زيادة الوزن. تختفي هذه

الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء.

الأعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً: تشوش الرؤية، بليلة، هلوسة، غثيان، امسك، نبض سريع، صعوبة في در البول، ارتفاع العضلات (زاد): توقف عن العلاج وتوجه للطبيب. انخفاض في الوظيفة الجنسية (زاد): استمر في العلاج وتوجه للطبيب.

الم في العينين، عدم هدوء، مشاكل في الكلام أو البلع، قلة توازن، صلافة في الأطراف والرجل توجه للطبيب فوراً. في كل حال تظهر لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة لتعاملك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

حسب تعليمات الطبيب فقط!

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها أو الفترة الموصى بها.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تذكرك، ولكن يمنع بتاتاً تناول جرعتين معاً.

إرشادات الاستعمال: هذا الدواء ليس للمضغ؛ يبلع الدواء مع القليل من الماء.

يجب تناول هذا الدواء مع أو بعد الوجبة.

يُمنع طحن أو قسم الأقراص.

كيف بإمكانك المساعدة في نجاح العلاج؟

عليك أكتمال العلاج الذي أوصى به الطبيب.

حتى إذا حدث تحسين على صحتك يُمنع التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب.

يجب أن يكون التوقف عن العلاج بشكل تدريجي، يتطلب وقت حتى الحصول على فعالية غير اكتئابية للدواء (بين ١-٦ أسابيع).

تحجب / التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي أضرارهم بالتسمم. إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل /ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى

حالا مصطحبا عبوة الدواء. لا تسبب /ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! سُجّل هذا الدواء علاج مرضك أنت، قد يضر هذا الدواء مريضاً آخر. يُمنع إعطاء هذا الدواء للأقارب، جيرانك أو معارفك. لا لتتناول / لا تتناول في العنينة: يجب تشخيص

طبيب الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول / في فيها دواء. ضع /ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان جاف وبدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط. حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين، الرجاء

ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك؛ عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٠٣٠-١٥-٢٠٠٩٢-٠٠

المنتج: ريك هاملخا الدوائية م.ض، شارع هاميلخا ٣٠ حولون