

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

קלופיקסול 25 מ"ג טבליות	קלופיקסול 10 מ"ג טבליות	קלופיקסול 2 מ"ג טבליות	קלופיקסול טיפות
הרכב (חומר פעיל):	הרכב (חומר פעיל):	הרכב (חומר פעיל):	הרכב (חומר פעיל):
Zuclopenthixol (as dihydrochloride) 25 mg	Zuclopenthixol (as dihydrochloride) 10mg	Zuclopenthixol (as dihydrochloride) 2mg	Zuclopenthixol (as dihydrochloride) 20 mg/ml (1 drop=1 mg)
זוקלופנטיקסול (כדיהידרוכלוריד) 25 מ"ג	זוקלופנטיקסול (כדיהידרוכלוריד) 10 מ"ג	זוקלופנטיקסול (כדיהידרוכלוריד) 2 מ"ג	זוקלופנטיקסול (כדיהידרוכלוריד) 20 מ"ג/מ"ל (1 טיפה=1 מ"ג)

מרכיבים בלתי פעילים: ראה סעיף 6.

- קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
- התרופה אינה מיועדת לילדים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה קלופיקסול מיועדת לטיפול בסכיזופרניה חריפה ובפסיכוזות חריפות אחרות. קבוצה תרפויטית: תרופות אנטי-פסיכוטיות, נגזרת של תיוקסנטן.

התרופה קלופיקסול מכילה את החומר הפעיל zuclopenthixol. התרופה שייכת לקבוצת התרופות האנטי-פסיכוטיות (נקראות גם נירולפטיות). תרופות אלו פועלות על מסלולים עצביים מסוימים במוח ומסייעות לתקן מצבים מסוימים של חוסר איזון כימי במוח, הגורמים לתסמינים של מחלתך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (Zuclopenthixol) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה קלופיקסול המופיעים בסעיף 6.
- אתה תחת השפעת אלכוהול, תרופות חזקות כנגד כאב (מורפין), או תרופות לטיפול באפילפסיה (פנוברביטל).
- אתה סובל מירידה חמורה של לחץ הדם או מכשל לבבי.
- לתשומת לב: אין לתת קלופיקסול למטופלים חסרי הכרה

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בקלופיקסול, ספר לרופא אם:

- הנך סובל ממחלת כבד.
- הנך סובל או אם יש לך היסטוריה של עוויתות או פרכוסים.
- יש לך סוכרת (יתכן ותידרש התאמה מחדש של מינון האינסולין ו/או התרופות האחרות לטיפול בסוכרת).
- הנך סובל מפגיעה מוחית בעקבות הרעלת אלכוהול או השימוש בממסים אורגניים.
- אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול או תרופות חזקות כנגד כאב (מורפין ותרופות דמויות מורפין).
- הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב.
- מישהו ממשפחתך סובל ממחלת לב, קצב לב נמוך או שינויים באק"ג (הארכת מקטע QT).
- הנך נוטל תרופה אנטי-פסיכוטית אחרת (לדוגמא: ליתיום, הלופרידול או פרפנזין).

- אתה סובל מעיכוב התפתחותי.
- לך או לאחד מבני משפחתך יש היסטוריה של הופעת קרישי דם, כיוון שנמצא קשר בין תרופות מסוג זה והיווצרות קרישי דם.

אזהרות נוספות:

- חלק מהחולים (למשל מבוגרים, או כאלה סובלים משטיון, דמנציה) נמצאים בסיכון מוגבר ללקות בשבץ. היוועץ ברופא.
- יש ליצור קשר עם הרופא באופן מיידי אם אתה מפתח חום גבוה יחד עם נוקשות בשרירים ובתנועה, הזעה מרובה וירידה בהכרה (סימנים לתסמונת נירולפטית ממארת- malignant neuroleptic syndrome). מצב זה עלול להיות מסכן חיים ועל כן דורש התערבות רפואית מיידי.
- טיפות קלופיקסול מזיקות לאנשים הסובלים מאלכוהוליזם. מכיוון שטיפות קלופיקסול מכילות אתנול, נשים בהריון ומניקות, כמו גם חולי אפילפסיה והסובלים ממחלות כבד יטלו טיפות קלופיקסול רק לאחר התייעצות עם הרופא.
- יש ליידע את הצוות הרפואי כי הינך מטופל בתרופה זו כאשר אתה עובר בדיקות דם ושתן. התרופה עשויה להשפיע על תוצאות הבדיקות.

תגובות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח תרופות:

- לטיפול בהפרעות קצב (כדוגמת אמיודרון, סוטלול)
- לטיפול בהפרעות נפשיות (כדוגמת ליתיום, הלופרידול, פרנזין)
- נגד דיכאון ממשפחת הטריציקליים (כדוגמת אמיתריפטילין, אימיפרמין)
- לטיפול בחרדה, חוסר שקט ונדודי שינה (כדוגמת דיאזפאם, פלוניטראזפאם)
- לטיפול באפילפסיה (ברביטורטים כדוגמת פנוברביטל)
- לטיפול בפרקינסון (כדוגמת ביפרידן, לבדופה)
- להורדת לחץ דם (כגון: גואנטידין)
- לטיפול בזיהומים (תרופות כדוגמת אריתרומיצין, מוקסיפלוקסצין)
- לטיפול במחלות במערכת העיכול (כגון מטוקלופראמיד)
- תרופות אדרנרגיות, למשל לטיפול באסטמה (כדוגמת סלבוטמול, טרבוטלין)
- תרופות כנגד אלרגיה (אנטי-היסטמינים מסויימים) – היוועץ ברופא
- וכן, תרופות משתנות (כגון בנדרופלומטיאזיד, פורוסמיד)

טיפות קלופיקסול מכילות אתנול. אין ליטול טיפות קלופיקסול אם אתה מטופל בדיזולפיראם (disulfiram), תרופה המשמשת לטיפול בהתמכרות לאלכוהול) או במטרונידזול (לטיפול בזיהום). היוועץ ברופא.

לקלופיקסול עלולות להיות תגובות בין תרופתיות עם תרופות מסוימות, וקלופיקסול עלול להשפיע על הדרך שבה התרופות האחרות פועלות. בדרך כלל אין לדבר זה חשיבות מעשית. היוועץ ברופא או ברוקח לגבי מידע נוסף.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת קלופיקסול עם או בלי אוכל.

טיפות קלופיקסול: ניתן לקחת את הטיפות עם מים, מיץ תפוזים או מיץ תפוחים.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

קלופיקסול עלול להגביר את ההשפעה של אלכוהול ולגרום לך להיות ישנוני. לפיכך אין לשתות אלכוהול בזמן הטיפול בקלופיקסול.

היריון, הנקה ופוריות

אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת היריון, יש להיוועץ ברופא טרם השימוש בתרופה זו.

היריון

אם הנך בהריון אין ליטול תרופה זו אלא אם הרופא הורה על כך במפורש.

טיפות קלופיקסול מכילות אלכוהול. יש ליטול טיפות קלופיקסול רק בהתאם להוראת הרופא.

התסמינים הבאים עלולים להופיע בילודים, שנולדו לאימהות שנטלו קלופיקסול במהלך השליש האחרון להריון (3 החודשים האחרונים להריון): רעד, קישיון שרירים ו / או חולשת שרירים, ישנוניות, חוסר מנוחה, קשיי נשימה וקושי בהאכלה. אם תינוקך מפתח כל אחד מסמינים אלו, עליך לפנות לרופא.

הנקה

אם הנך מניקה, יש להימנע ברופא בטרם תשתמשי בתרופה.

פוריות

מחקרים בבעלי חיים הראו כי קלופיקסול משפיע על הפוריות. יש להימנע ברופא.

נהיגה ושימוש במכונות

קלופיקסול עלול לגרום לישנוניות במידה מסוימת (גדולה או פחותה). יש לשקול זאת כאשר נוהגים או מפעילים מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

קלופיקסול טיפות מכילה 120 מיליגרם אלכוהול (אתנול 96%) בכל מיליליטר, אשר הם שווים ערך ל 14.2%. כמות האלכוהול ב 1 מיליליטר של תרופה זו היא פחות מהכמות ב 3 מיליליטר של בירה או 2 מיליליטר של יין.

לכמות הקטנה של אלכוהול בתרופה זו לא תהיה כל השפעה שניתן להבחין בה. קלופיקסול טיפות הינה מזיקה לאלכוהוליסטים.

אם אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול, סובל מאפילפסיה או ממחלות כבד, או אם את בהריון או מניקה יש לשוחח עם הרופא וליטול את התרופה רק בהתאם להוראותיו.

אין ליטול **טיפות קלופיקסול** אם אתה מטופל בדיזולפיראם (disulfiram), תרופה המשמשת לטיפול בהתמכרות לאלכוהול) או במטרונידזול (לטיפול בזיהום). היוועץ ברופא.
טבליות קלופיקסול מכילות לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שהנך סובל מחוסר-סבילות לסוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא בטרם תשתמש בטבליות קלופיקסול.
טבליות קלופיקסול מכילות Hydrogenated Castor Oil, העלול לגרום כאבי בטן ושלשול.

3 . כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון עשוי להשתנות מאוד ותלוי בחומרת המחלה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים

סכיזופרניה, מניה ופסיכוזות אחרות

מינון התחלתי נע בין 10 מ"ג ל-50 מ"ג ליום (בתכשיר קלופיקסול טיפות: 10-50 טיפות ליום). ניתן להעלות את המינון בהדרגה עד 75 מ"ג ליום (בתכשיר קלופיקסול טיפות: 75 טיפות ליום).
במקרים מסוימים ידרש מינון גבוה הרבה יותר. המינון המקסימלי למנה הוא 40 מ"ג והמינון המקסימלי היומי הוא 150 מ"ג ליום (בתכשיר קלופיקסול טיפות: 150 טיפות ליום).
מנת האחזקה היא בדרך כלל 20-40 מ"ג ליום (בתכשיר קלופיקסול טיפות: 20-40 טיפות ליום).

מטופלים עם סיכונים מיוחדים: לקשישים ולמטופלים הסובלים מבעיות בכבד, יינתן בדרך כלל המינון הנמוך ביותר בטווח המינונים.

שימוש אצל ילדים

קלופיקסול אינו מיועד לשימוש בילדים.

אין לעבור על המנה המומלצת

אם הנך חש שהשפעת התרופה חזקה מידי או חלשה מידי, התייעץ עם הרופא או הרוקח.

אופן השימוש:

טבליות: אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים.

טיפות: יש לספור את מספר הטיפות הרצוי לתוך השתיה (מים, מיץ תפוזים או מיץ תפוחים), לערבב קלות ולשתות את הכל.

בתחילת הטיפול, בדרך כלל נוטלים קלופיקסול ב-2-3 מנות נפרדות במשך היום. בשלב האחזקה של הטיפול, ניתן ליטול קלופיקסול במינון חד-יומי.

משך הטיפול

כמו תרופות אחרות לטיפול בפסיכוזות, יתכן ויחלפו כשבועיים עד שתחוש בשיפור בהרגשתך. משך הטיפול יקבע על ידי הרופא שלך. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא או עם רוקח, כיוון שתסמיני מחלתך עלולים לחזור. אין לשנות את המינון של התרופה מבלי להתייעץ עם הרופא.

דרך המתן

סובב את הבקבוק כך שהוא יהיה מהופך לחלוטין. אם אף טיפה לא יוצאת ממנו, הקש בעדינות על הבקבוק בכדי להתחיל את הזרימה.



אם קיבלת בטעות מינון גבוה מידי

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא שלך או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה אתך. עשה זאת גם אם אינך חש ברע או בתסמינים של מינון יתר.

תסמינים אפשריים של מינון-יתר:

- ישנוניות
- חוסר הכרה המתפתח לתרדמת
- התכווצויות שרירים, תנועות בלתי רצוניות
- תנועות שרירים או נוקשות שרירים
- פרכוסים
- לחץ דם נמוך, דופק חלש, דופק מהיר, חיורון, אי-שקט
- טמפרטורת גוף נמוכה או גבוהה
- שינויים בקצב הלב, כולל קצב לב בלתי-סדיר או קצב לב איטי (אירע כאשר קלופיקסול ניתן במינון יתר יחד עם תרופות הידועות כמשפיעות על קצב הלב).

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא. הרופא שלך יחליט מתי וכיצד להפסיק את הטיפול, על מנת להימנע מתסמינים לא נעימים אשר עלולים להופיע אם מפסיקים ליטול את התרופה בפתאומיות (למשל, בחילות, הקאות, שלשול, סלידה ממזון, נזלת, הזעה, כאבי שרירים, עקצוץ / דקרו של העור, נדודי שינה, חוסר מנוחה, חרדה, עצבנות, רעידות, סחרחורת ותחושה של חום או קור).

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלופיקסול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא או לבית חולים אם הנך חש/ה באחד מהסימפטומים הבאים:

תופעות לוואי חמורות

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 100)
- קצב לב מהיר. פנה לרופא או לחדר מיון.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 1000):

- פרכוסים. פנה מיידית אל הרופא או אל חדר המיון .

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 10,000):

- הפרעות חמורות בפעילות הלב כולל קצב לב מהיר ויתכן שגם בלתי סדיר, העלולות להוביל לדום לב. יש לפנות לרופא או לחדר מיון מיידית.
- תגובות רגישות יתר פתאומיות כגון פריחה, קשיי נשימה ועילפון (תגובה אנפילקטית). יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. מצב זה עלול להיות מסכן חיים.
- דימום מהעור ומהריריות ושטפי דם בשל שינויים בדם (ספירת טסיות נמוכה). פנה מיידית לקבלת טיפול רפואי.
- חולשה כללית, נטייה לדלקות (זיהומים), במיוחד דלקת שקדים וחום בשל שינויים בדם (מחסור חמור בתאי דם לבנים). פנה לקבלת טיפול רפואי מידי.

תופעות לוואי נדירות מאד (מופיעות בפחות ממטופל אחד מתוך 10,000):

- חום גבוה, קשיות שרירים בלתי רגילה ושינוי במצב ההכרה, הזעה מוגברת ודפיקות לב. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. מצב זה עלול להיות מסכן חיים.
- דלקת כבד, הצהבה של העור ולובן העין (צהבת). פנה אל הרופא או אל חדר המיון.

תופעות לוואי לא חמורות

תופעות לוואי שכיחות מאד, מופיעות ביותר ממטופל אחד מעשרה

- תנועות לא רצונית, איטיות או מהירות או קישיון שרירים או חוסר יכולת לשבת במנוחה או לעמוד ללא תנועה.
- נמנום.
- יובש בפה, העלול לגרום לעליה בסיכון לעששת.

תופעות לוואי שכיחות, מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 100:

- דיכאון. במטופלים מסוימים הדיכאון עלול להתפתח לתופעת לוואי חמורה. היוועץ ברופא.
- הפרעות במתן שתן, תתכן גם אצירת שתן. במטופלים מסוימים המצב עלול להתפתח לתופעת לוואי חמורה. היוועץ ברופא.
- דפיקות לב מהירות.
- רעד, עליה במתח השרירים, סחרחורת.
- כאב ראש, ירידה ביכולת הריכוז, איבוד זיכרון.
- תחושה של עקצוץ או דקירות או ירידה בתחושה של העור.
- צורת הליכה לא רגילה.
- טשטוש ראייה או הפרעות בראייה.
- גודש באף, קוצר נשימה.
- ייצור מוגבר של רוק, עצירות, הקאה, תחושת אי-נוחות בבטן, שלשול.
- הפרעות במתן שתן, לדוגמא דחף לתת שתן לעיתים קרובות, השתנה בלתי רצונית.
- הזעה מוגברת, גרד.
- כאב, כאב שרירים.
- עליה בתאבון, עליה במשקל.
- חולשה, עייפות, אי נוחות גופנית.
- דודי שינה, חרדה, עצבנות, חלומות משונים, אי שקט, ירידה בחשק המיני.

תופעות לוואי שאינן שכיחות, מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 1,000:

- תנועות איטיות, בלתי רצונית, נוקשות שרירים
- רעד של הידיים והראש, נוקשות בתנועות ובהבעת הפנים, תנועות של טלטול ופיתול, במיוחד של הרגליים, ירידה בכוח השריר.
- עילפון, תנועות בלתי בטוחות, הפרעות בדיבור, מיגרנה.
- תנועות סיבוביות של העיניים, הרחבת אישונים.

- עליה ברגישות לרעש, צפצופים באוזניים (טיניטוס).
- כאבי בטן, בחילה, נפיחות במערכת העיכול.
- פריחה, רגישות מוגברת של העור לאור שמש, שינויים בפיגמנטציה, עור שמנוני מאוד.
- אקזמה או גירוי עורי, דימום קל בעור ובריריות.
- נעילת הלסת בשל מתח בשרירי הלעיסה, תנוחה לא טבעית של הראש.
- תיאבון מופחת, ירידה במשקל, צימאון מוגבר.
- גלי חום, חום גוף נמוך מהרגיל, חום גבוה.
- אין – אונות והעדר פליטת זרע.
- העדר אורגזמה אצל נשים, יובש בנרתיק.
- אפאתיה, סיוטים, עליה בחשק המיני, בלבול.

תופעות לוואי נדירות, מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 10,000:

- קצב לב מהיר, איטי ו/או בלתי סדיר. תופעה זו עלולה להיות חמורה. פנה אל הרופא.
- חולשה כללית, נטייה לדלקת (זיהום) במיוחד דלקת שקדים וחום בשל שינויים בדם (ירידה בספירת טסיות). מצב זה עלול להחמיר. אם אתה מפתח חום עליך ליצור קשר עם הרופא מיידית.
- השתנה תכופה, צימאון, עייפות עקב רמת סוכר גבוהה בדם (גלוקוז בדם). במטופלים מסוימים, הדבר עלול להתפתח לתופעת לוואי חמורה. היוועץ ברופא שלך.
- עליה בסיכון לטרשת עורקים בשל עליה בכולסטרול בדם.
- רגישות יתר.
- הגדלת השדיים בגברים, זקפה ממושכת ומכאיבה.
- הפרשת חלב, היעדר מחזור חודשי בנשים.

קלופיקסול עלול לגרום לתופעות לוואי נוספות, אשר בדרך כלל אתה לא תבחין בהן. הללו כוללות שינויים בתוצאות בדיקות מעבדה מסוימות בשל ההשפעה על הדם, גרף האק"ג והכבד. תוצאות הבדיקות ישובו לערכים הנורמליים עם הפסקת הטיפול בתרופה.

דווח על היווצרות קרישי דם בורידים, בייחוד ברגליים (מתבטא בנפיחות, כאב ואדמומיות של הרגל). קרישי הדם עלול לזוז ממקומו ולנדוד באמצעות הדם אל הריאות ולגרום לכאב בחזה ולקשיי נשימה. אם הופיע אצלך אחד מהתסמינים הללו, פנה מיד אל הרופא.

בחולים קשישים הסובלים משיטיון (דימנציה), דווחה עליה קלה במקרי מוות במטופלים שנטלו תרופות אנטי-פסיכוטיות בהשוואה לאלו שלא נטלו תרופות אנטי-פסיכוטיות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור: "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.
- אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

טיפות: אחסן במקרר (2°-8°C). יש לשמור על הבקבוק בתוך האריזה על מנת להגן מפני אור. לאחר פתיחה ראשונה, יש להשתמש בטיפות תוך 6 שבועות כאשר הן מאוחסנות מתחת ל 25°C.

טבליות 10 מ"ג, 25 מ"ג: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

טבליות 2 מ"ג: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C באריזה המקורית בכדי להגן מפני אור.

- אין להשליך תרופות לאשפה הביתית או לשירותים. התייעץ עם הרוקח כיצד להשליך תרופה שאין בה צורך יותר, על מנת להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

טבליות:

Potato Starch, Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Talc, Copovidone, Glycerol 85%, Hypromellose (5mPa.s), Castor oil hydrogenated, Magnesium stearate, Red iron Oxide (E172), Macrogol 6000 NF, Titanium dioxide (E171)

כל טבלית קלופיקסול 2 מ"ג מכילה 17.4 מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל טבלית קלופיקסול 10 מ"ג מכילה 21.6 מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל טבלית קלופיקסול 25 מ"ג מכילה 22 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

טיפות: Purified water, ethanol (96%) . הטיפות מכילות 14.2% אלכוהול (120 מ"ג לכל מ"ל).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות קלופיקסול 2 מ"ג: טבליה מצופה עגולה, דו-קמורה, בצבע אדום בהיר.
טבליות קלופיקסול 10 מ"ג: טבליה מצופה עגולה, דו-קמורה, בצבע אדום-חום בהיר.
טבליות קלופיקסול 25 מ"ג: טבליה מצופה עגולה, דו-קמורה, בצבע אדום-חום.
קלופיקסול טיפות: תמיסה צלולה חסרת צבע עד צבע צהבהב, נטולת ריח ובעלת טעם מעט מריר.

טבליות קלופיקסול מוגשות באריזות המכילות 50 או 100 טבליות במיכלי HDPE .
20 מ"ל של קלופיקסול טיפות מוגש בבקבוק זכוכית בעל טפטפת.

בעל הרישום וכתובתו:

לונדבק ישראל בע"מ, דרך השלום 4, ת.ד. 7382, תל אביב.

שם היצרן וכתובתו :

H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

נערך בדצמבר 2020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

טבליות 2 מ"ג: 047-84-25485

טבליות 10 מ"ג: 047-86-25486

טבליות 25 מ"ג: 047-85-25487

טיפות: 047-87-25488

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
