

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קוויטיאפין סנדוז	קוויטיאפין סנדוז
50 מ"ג פי.אר.טי	150 מ"ג פי.אר.טי
טבליות בשחרור מושהה	טבליות בשחרור מושהה
הרכב:	הרכב:
כל טבליה מכילה: quetiapine 50 mg (as fumarate)	כל טבליה מכילה: quetiapine 150 mg (as fumarate)
קוויטיאפין סנדוז	קוויטיאפין סנדוז
200 מ"ג פי.אר.טי	300 מ"ג פי.אר.טי
טבליות בשחרור מושהה	טבליות בשחרור מושהה
הרכב:	הרכב:
כל טבליה מכילה: quetiapine 200 mg (as fumarate)	כל טבליה מכילה: quetiapine 300 mg (as fumarate)
קוויטיאפין סנדוז	קוויטיאפין סנדוז
400 מ"ג פי.אר.טי	400 מ"ג פי.אר.טי
טבליות בשחרור מושהה	טבליות בשחרור מושהה
הרכב:	הרכב:
כל טבליה מכילה: quetiapine 400 mg (as fumarate)	

חומרים בלתי פעילים וארלגניים: ראה סעיף 2, תת-סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

התרופה אינה מיועדת לקשישים הסובלים מדמנציה.

• תרופות נוגדות דיכאון וחדרה מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בלידים, מתבגרים ומבוגרים צעירים עד גיל 25. עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה. אם חלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.
• מטופלים לקשישים הסובלים מפסיכזה הקשורה במצנצה והמטופלים בתרופות אנטי-פסיכטיות נמצאים בסיכון מוגבר למוות.

1. למה מיועדת התרופה?

- לטיפול בסכיזופרניה.
- לטיפול במצב מאניה הקשור להפרעות ביפולריות.
- לטיפול בדיכאון הקשור להפרעות ביפולריות.
- לטיפול בדיכאון יחד עם תרופה נוספת לטיפול בדיכאון.

קבוצה תרפוטית:

תרופות אנטי פסיכוטיות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה סעיף 6 - "מידע נוסף")
- הינך נוטל את התרופות הבאות:
 - תרופות לטיפול בתסמונת השכל החיסוני הנרכש (HIV)
 - תרופות ממשפחת האזולים (לטיפול בזיהומים פטרייתיים)
 - ארתרומיצין או קלריתרומיצין (לטיפול בזיהומים)
 - נפאזודון (לטיפול בדיכאון)
- אם אינך בטוח פנה לרופא לפני נטילת קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי לפני הטיפול בקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי ספר להלן אם:

- יש לך לחץ דם נמוך.
- הינך סובל מבעיות בכבד.
- היו לך אי פעם פרכוסים.
- היה לך שבץ, בעיקר אם הינך קשיש.
- הייתה לך בעבר ספירת תאי דם לבנים נמוכה (אשר יכלה להיגרם או יכלה לא להיגרם משימוש בתרופות אחרות).
- אתה או מישהו מבני משפחתך סובל או סבל בעבר מבעיות בלב, כגון הפרעות בקצב לב, החלשות או דלקת של שריר הלב או אם הינך נוטל תרופות המשפיעות על קצב הלב.
- יש לך או לבן משפחתך היסטוריה רפואית של קרישי דם, כיוון שתרופות מסוג זה מעורבות ביצירת קרישי דם.
- הינך סובל מסוכרת או אם הינך בקבוצת סיכון לחלות בסוכרת. במקרה כזה, ייתכן שהרופא יבדוק את רמות הסוכר בדמך בזמן שאתה מטופל בקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי.
- אין לטיל קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי אם הינך קשיש עם שיטיון (דמנציה), כיוון שקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי עלולה להגביר את הסיכון לשבץ, או במקרים מסוימים עלולה להגביר את הסיכון למוות אצל קשישים עם דמנציה.
- הינך קשיש הסובל ממחלת פרקינסון/פרקינסוניזם.
- יש לך או איה לך מצב של הפסקת נשימה קצרות בעת שינת הלילה (נקרא דום נשימה - אפניאה) ואתה נוטל תרופות אשר מאטות את הפעילות הרגילה של המוח.
- יש לך או היה לך מצב של חוסר יכולת לרוקן לגמרי את שלפוחית השתן (איצרת שתן), בלוטת ערמונית מוגדלת, חסימת מעי או עלייה בלחץ התוך עיני. אלו מצבים הנגרמים מתחילת הפעול על-ידי תרופות (הנקראות אנטיכולינרגיות) המשפיעות על האופן בו תא עצב מתפקד במטרה לטפל במצב רפואי כלשהו. יש לך היסטוריה של התמכרות לאלכוהול או לתרופות.

ידע את הרופא באופן מיידי אם הינך חש באחד מהבאים לאחר נטילת **קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי**:

- שילוב של חום, קשיין שרירים חריף, הזעה או ירידה בהכרה (זו תופעה הנקראת "neuroleptic malignant syndrome"). ייתכן שתידרש לטיפול רפואי דחוף.
- תנועות בלתי רצוניות, בעיקר בפגים ובלשון.
- סחרחורת, אם הינך חש ישנוניות, דבר שיכול להעלות סיכון של נפילה מקרית אצל אנשים קשישים.
- פרכוסים.
- זקפה ארוכה, מתמשכת וכואבת.

ידע את הרופא בהקדם האפשרי אם הינך חש באחד מהבאים לאחר נטילת **קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי**:

- חום, תסמינים דמויי שפעת, כאב גרון או כל זיהום אחר, כיוון שהדבר יכול להיות תוצאה של רמה נמוכה מאוד בספירת כדוריות דם לבנות, דבר שיתכן שירוש הפסקת טיפול בקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי ו/או מתן טיפול.
- עצירות עם כאב בטן מתמשך, או עצירות שלא הגיבה לטיפול תרופתי. הדבר יכול להוביל למצב חמור יחד עם תסימת המעי.
- מחשבות אובדניות וחמרה של דיכאון**

דיכאון ידוע כגורם סיכון למחשבות אובדניות. עלייה במחשבות אובדניות יכולה להתרחש בתחילת הטיפול עם קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי. שילוקח זמן עד להתרופה מתחילה לפעול, כשבעיים ולעיתים יותר מכן. מחשבות אלה יותר נפוצות בקרב מבוגרים צעירים. מידע ממחקרים קליניים מראה עלייה בסיכון למחשבות אובדניות ו/או התנהגות אובדנית בקרב מבוגרים צעירים מתחת לגיל 25 שנים הסובלים מדיכאון. מחשבות אלה יש לך מחשבות אובדניות, יש לפנות מיידית לרופא או לבית חולים. שיתוף תחושת הדיכאון עם קרוב משפחה או חבר קרוב יכול לסייע, ויש להפנותם לקרוא עלון זה. תוכל לבקש מהם לומר לך אם הם חשים כי הדיכאון מחמיר או שהם מודאגים ששינויים בהתנהגות שלך.
- תופעות לוואי עוריות חמורות (Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCARs)**

תופעות לוואי עוריות חמורות (SCARs), עלולות להיות מסכנות חיים או קטלניות דווחו לעיתים מאוד נדירות במהלך הטיפול עם תרופה זו. תופעות אלו בדרך כלל מופיעות בתוך 2 שבועות לאחר תחילת הטיפול. תופעות אלו כוללות תסמונת טיבס-ג'ונסון (Stevens-Johnson Syndrome, SJS), פריחה מפושטת עם שלפוחיות ועור מתקלף, במיוחד סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין.

מצב הקרוי טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN) – תופעה חמורה יותר הגורמת לקילוף נרחב של העור. תסמונת DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) – תסמונת הרגישות התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים – כוללת תסמינים דמויי שפעת המלווים בפריחה, חום, בלוטות לימפה מוגדלות, ובדיקות דם חריגות (כולל עלייה בתאי הדם הלבנים (אאוזינופיליה) ועלייה ברמת אנזימי כבד).

אם הינך רוצה למסחמינים אלה יש להפסיק לטיל קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי ולדווח לרופא או לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי.

עלייה במשקל

עלייה במשקל לצפונה בחולים הנוטלים קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי, עלוך לעקוב יחד עם הרופא אחר משקלך באופן שוטף.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18!

אם אתה לוקח תרופות אחרות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין לטיל קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- תרופות לטיפול בתסמונת השכל החיסוני הנרכש (HIV)
- תרופות ממשפחת האזולים (לטיפול בזיהומים פטרייתיים)
- ארתרומיצין או קלריתרומיצין (לטיפול בזיהומים)
- נפאזודון (לטיפול בדיכאון)
- יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
 - תרופות לאיפילסיה (כגון פיטוטאין או קארבאמאזפין)
 - תרופות להורדת לחץ דם
 - ברביטורטים (למדודי שינה)
 - תיורדיין או ליתיום (תרופות אנטי-פסיכוטיות)
 - תרופות המשפיעות על קצב הלב, למשל תרופות שיכולות לגרום לחוסר איוון באלקטרוליטים (רמות נמוכות של אשלגן ומגנזיום), כגון תרופות משנות או אנטיביוטיקות מסוימות (תרופות לטיפול בזיהומים)
 - תרופות שקולות לגרום לעצירות
 - תרופות (קראות אנטיכולינרגיות) המשפיעות על הדרך בה מערכת העצבים, כדי לשלב ממצבי רפואים מסוימים

לפני הפסקת נטילה של אחת מהתרופות שהינך נוטל, יש לפנות לרופא.

שימוש בתרופה ומזון

אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. מיץ אשכוליות יכול להשפיע על האופן בו התרופה פועלת.

- קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי עשוייה להיות מושפעת ממזון. משום כך יש לטיל את התרופה על קיבה ריקה, לפחות שעה לפני האוכל.

שימוש בתרופה וגריכת אלכוהול

יש להיזהר בכמות האלכוהול שהינך צורך. שילוב של קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי ואלכוהול יכול לגרום לישנוניות.

הריון והנקה

אם הינך בהריון, מתכננת הריון או מיניקה יש היוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. אין לטיל קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי במהלך הריון, אלא אם דיברת על כך עם הרופא. אין לטיל קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי בזמן הנקה. התסמינים הבאים יכולים להתרחש אצל ילודים שאומותיהם נטלו קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי שרורים, שנוגזים, או אצטילסליציט, בעיות נשימה וקשיי אילה. אם תינוקך מפתח אחד מסתמינים אלו על-יין לפנות לרופא המטפל.

הגייה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לישנוניות. אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות לפני שאתה יודע כיצד התרופה משפיעה עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הטבליות מכילות לקטוז הנכשל היחסוני הנרכש (HIV) שאינך יכול לעכל סוכרים מסוימים. היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

קוויטיאפין סנדוז 50 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 150 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 200 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 300 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 400 מ"ג פי.אר.טי
14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
קוויטיאפין סנדוז 50 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 150 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 200 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 300 מ"ג פי.אר.טי	קוויטיאפין סנדוז 400 מ"ג פי.אר.טי
מכילה 42.630	מכילה 42.630	מכילה 42.630	מכילה 56.840	מכילה 56.840
מכילה 56.840	מכילה 56.840	מכילה 56.840	מכילה 85.260	מכילה 85.260
מכילה 142.10	מכילה 142.10	מכילה 142.10	מכילה 185.680	מכילה 185.680

השפעה על תוצאות בדיקות שתן

קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי יכולה לגרום לנדידה חיובית בטריקיות שתן לתרופות שאינך נוטל כגון מתדון או תכשירים לטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול תקינות תוצאות אלו באמצעות בדיקות נוספות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלוך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול

יבקעו על-ידי הרופא בלבד. הרופא יתאים את המנה היומית של התרופה במינונים בטווח בין 50 מ"ג ל- 800 מ"ג בהתאם למחלה ולצרכים האישיים.

- אין לעבור על המנה המומלצת.**
- יש לטיל את הטבליות פעם ביום.
- הורדת המינון תבוצע באופן הדרגתי לפני הפסקת הטיפול.
- אין להפסיק את הטיפול בתרופה אף אם אתה חש הטבה במצבך אלא בהוראת הרופא בלבד.
- יש לטיל את התרופה על קיבה ריקה לפחות שעה לפני האוכל.

צורת הנטילה:

- צורת הלטוס, אין לכתוש ואין לחצות את הטבליות,** כיוון שהטבליות בשחרור מושהה.
- יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם מים.
- אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן הטיפול עם קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי. זה עלול להשפיע על דרך הפעולה של התרופה.

בעיות כבד

אם הינך סובל מבעיות כבד ייתכן שהרופא ישנה את המינון שלך.

קשישים

ייתכן שהרופא ישנה את המינון שלך אם אתה קשיש.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. ייתכן שתרגיש ישנוניות, סחרחורת ודפיקות לב חריגות.

אם שכחת לקחת את התרופה

אם שכחת לטיל תרופה זו בזמן הרופא או חזרה קצוב יש לטיל מנה מיד כשזכרת. אך בשום אופן אין לטילו שתי מנות ביחד. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלע על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק לקחת את התרופה

הפסקת התרופה בצורה פתאומית יכולה לגרום לתסמינים הבאים: חוסר יכולת לישון, בחילה, כאב ראש, שלשול, הקאות, סחרחורת ועצבנות. הרופא יכול להמליץ לך על הורדת הדרגתית של המינון.

אין לטיל תרופות בחושך! יש לבדוק תהויות והמנה **בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכוחות מאוד (מופיעות ביותר מאדם 1 מתוך 10 אנשים):

- סחרחורת (עלול לגרום לפילות), כאב ראש, יובש פה
- ישנוניות (יכולה להיעלם עם המשך השימוש בתרופה, עלול לגרום לנפילות) עלייה במשקל
- שינוי הפסקת טיפול (תסמינים המופיעים כאשר הינך מפסיק לקחת קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי) כוללים הקאות, סחרחורת, בחילה, כאב ראש, שלשולים, נדודי שינה ואי שקט. מומלץ להפסיק את הטיפול באופן הדרגתי למשך 1-2 שבועות
- תנועות שרירים לא רגילות (כוללות קושי בהתחלת תנועת השרירים, רעידות, תחושת חוסר מנוחה, אי קשיון שרירים ללא כאב)
- שינויים ברמות של שומנים מסוימים (טריגליצרידים וכולסטרול)

תופעות לוואי שכוחות (מופיעות בפחות מאדם 1 מתוך 10 אנשים):

- קצב לב מהיר
- הרגשה של דפיקות לב חזקות, מהירות או ידילוג על פעימות
- עצירות, קשיי עיכול
- חולשה
- נפיחות בדרועות או ברגליים
- לחץ דם נמוך בעמדה שתוצאתו עלולה להיות סחרחורת או תחושת עילפון (עלול לגרום לנפילות)
- עלייה ברמות הסוכר בדם
- שטטוש ראיה
- חלומות לא רגילים, סיוטים
- תחושת רעב מוגבר
- עצבנות
- הפרעות בדיבור ובשפה
- מחשבות אובדניות וחמרת הדיכאון
- קוצר נשימה
- הקאה (בעיקר בקשישים)
- חום
- שינויים ברמות הורמוני בלוטת התריס בדם
- ירידה ברמות של סוגים מסוימים של תאי דם
- עלייה ברמת אנזימי הכבד הנמדדים בדם
- עלייה ברמת ההורמון פרולקטין בדם. עלייה בהורמון פרולקטין במקרים נדירים עלולה להוביל ל:
 - חזה נפוח בגברים ובנשים ומתן חלב במוזר בלתי צפוי
 - הפסקת המחזור חודשי אצל נשים או מחזור חודשי לא סדיר

תופעות לוואי לא שכוחות (מופיעות בפחות מאדם 1 מתוך 100 אנשים):

- פרכוסים או עוניתות
- תגובות אלרגיות שיכולות לכלול גושים מורמים על העור, נפיחות בעור ונפיחות מסביב לפה
- תסמונת הרגליים העצבניות (תחושה לא נעימה ברגליים)
- קשיים בבליעה
- תנועות לא נשלטות, בעיקר של הפנים או הלשון
- קשיים בתפקוד מיני
- שינוי הפעילות החשמלית של הלב שנראית בבדיקת ECG (הארכת מקטע QT)

- קצב לב איטי מהרגיל, דבר שיכול לקרות בתחילת הטיפול, ויכול להיות קשור ללחץ דם נמוך ולהתעלפויות
- התפתחות סוכרת, או החמרה בסוכרת קיימת
- קשיים במתן שתן
- גודש באף
- התעלפות (עלול לגרום לנפילות)
- ירידה בכמות של תאי דם אדומים
- ירידה בכמות של נתח בדם

תופעות לוואי נדירות (מופיעות בפחות מאדם 1 מתוך 1,000 אנשים):

- שילוב של חום, הזעה, נוקשות שרירים, עיפות חריפה או עלפון, עלייה גדולה בלחץ הדם או בדפיקות הלב (הנקראות התסמונת (neuroleptic malignant syndrome) הצהבה של העור והעיניים (צהבת)
- דלקת בכבד (הפטיטיס)
- זקפה ארוכה וכואבת
- נפיחות בשד וייצור חלב בלתי צפוי
- קרישי דם בוורידים, במיוחד ברגליים (מתבטא בנפיחות, כאב ואדמומיות של הרגל), העלולים להגיע עם זרם הדם לריאות ולגרום כאבי חזה וקשיי נשימה. אם אתה מבחין באחד מהתסמינים האלה יש לפנות מיידית לקבלת סיוע רפואי

- שיבוש הוופעת המחזור החודשי בנשים
- הליכה, דיבור, אכילה ועזירות אחרות בעת שינה
- ירידה בטמפרטורת הגוף (היפותרמיה)
- דלקת הלבלב
- מצב בו יש שילוב של שלושה או יותר מהתסמינים הבאים: עלייה בשומן הבטני, ירידה ברמת "הכולסטרול הטוב" (HDL-C), עלייה ברמות טריגליצרידים בדם, לחץ דם גבוה ועלייה בסוכר בדם (מטבוליק סינדרום)
- שילוב של חום, תסמינים דמויי שפעת, כאב גרון, כיבים בפה או כל זיהום אחר יחד עם ספירה מאוד נמוכה של תאי דם לבנים, מצב הנקרא ארגנולוציטוזיס
- חסימת מעי
- עלייה ברמות קראטינין פוספוקינאז בדם

תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות כפחות מ- 1 מתוך 10,000 אנשים):

- תגובה אלרגית חמורה (נקראת שוק אנפילקטי) יכולה לכלול קשיי נשימה והלם התנפחות מהירה של העור, לרוב סביב העיניים, השפתיים והגרונן (אנגיאדמה)
- מצב חמור של שלפוחית בעור, בפה, בעיניים ובאיברי המין (תסמונת טיבס-ג'ונסון). ראה סעיף 2
- פריחה חריפה, שלפוחיות, או אזורים אדומים בעור
- הפרשה לא תקינה של ההורמון ששולט בנפח השתן
- פירוק סיבי השריר וכאבי שרירים (רבדומיוליזיס)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה:

- פריחה בעור עם נקודות אדומות או סדירות
- תגובה אלרגית חריפה פתאומית עם תסמינים כגון חום ושלפוחית על העור וקילוף העור (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס). ראה סעיף 2
- DRESS – תסמונת הרגישות התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים – כוללת תסמינים דמויי שפעת המלווים בפריחה, חום, בלוטות לימפה מוגדלות, ותוצאות חריגות בבדיקות דם (כולל עלייה בתאי הדם הלבנים (אאוזינופיליה) ועלייה ברמת אנזימי כבד). ראה סעיף 2
- תסמיני מגילה עלולים להתרחש ביילודים של אימהות שנטלו קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי בהריון
- שבץ

קבוצת התרופות אליהן משתייכת קוויטיאפין סנדוז פי.אר.טי עלולה לגרום להפרעות בקצב הלב, שעלולות להיות חמורות ובמקרים חמורים לגרום למוות.

תופעות הלוואי הבאות נראו בבדיקות דם:

- שינויים ברמת המסמינים בדם (טריגליצרידים וכולסטרול)
- שינויים ברמת הסוכר בדם (גלוקוז)
- שינויים ברמות הורמוני בלוטת התריס
- ירידה בכמות תאי דם מסוגים מסוימים
- ירידה בכמות תאי הדם האדומים; בפה, בעיניים ובאיברי הכבד
- עלייה ברמות האנזימי הכבד
- ירידה ברמות הנתחן בדם
- עלייה ברמות האנזים קריאטיין פוספוקינאז, מרכיב בשריר
- עלייה ברמות הורמון הפרולקטין בדם. לעיתים נדירות זה עלול לגרום ל:
 - התנפחות חזהה בגברים ובנשים וייצרת חלב
 - הפסקת המחזור החודשי או מחזור לא סדיר אצל נשים

אם הופיעה תופעת לוואי, יש לא אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלוך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המנהל לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. **אין לגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרת תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.